

Opciones de Tratamiento Oral para la COVID-19

OBTENGA INFORMACIÓN SOBRE MEDICAMENTOS ORALES QUE PUEDE TOMAR EN SU HOGAR PARA TRATAR LA COVID-19 DE LEVE A MODERADA.



Paxlovid™ y **Lagevrio™** son medicamentos antivirales orales. Están aprobados y tienen autorización de uso de emergencia otorgada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE. UU. para tratar la COVID-19. Además, se ha comprobado su **seguridad y eficacia**.

Estos tratamientos antivirales orales **no reemplazan las vacunas ni las vacunas de refuerzo**. Ayudan a disminuir el riesgo de hospitalización o, peor aún, de muerte a causa de la COVID-19.

Si tiene síntomas de COVID y dio positivo para COVID-19, pueden recetarse estos medicamentos ambulatorios contra la COVID para ayudar a combatir síntomas de leves a moderados. Debe comenzar a tomar los medicamentos lo antes posible luego de que haya dado positivo para COVID. Además, debe tomarlos dentro de los cinco días de la aparición de los síntomas.

Paxlovid

El Panel de Pautas de Tratamiento de la COVID-19 recomienda Paxlovid como el tratamiento preferido para personas que hayan dado positivo mediante la prueba viral de SARS-CoV-2. También se recomienda para personas con riesgo alto de desarrollar COVID-19 grave (lo que incluye hospitalización o muerte).

Lagevrio

El Panel de Pautas de Tratamiento sugiere usar Lagevrio **solo cuando no está disponible Paxlovid** o cuando no se puede usar Paxlovid.

Asegúrese de hablar con su proveedor si tiene síntomas o si dio positivo para COVID. Los médicos de Babylon y de atención de urgencia pueden recetarle tratamientos orales para la COVID.

Para obtener más información sobre Paxlovid y Lagevrio, consulte el cuadro de la página 2.

(continúa)



Encuentre farmacias de manera sencilla

Estas píldoras antivirales orales para la COVID-19 están disponibles solo con receta médica. Encuentre una farmacia donde pueda surtir las:

1 Use este código QR:



O visite este [sitio web](#) sobre tratamientos de la COVID-19.

- 2 Haga clic en el cuadro de búsqueda y escriba una dirección o un código postal.
- 3 Luego presione “Enter” (Entrar) para ver una lista de farmacias cercanas.

Píldoras antivirales para la COVID-19: Breve descripción

	Paxlovid (Pfizer) (Nirmatrelvir/ritonavir)	Lagevrio (Merck) (Molnupiravir)
¿Para qué debe tomarlas?	Úselas para tratar síntomas de la COVID-19 de leves a moderados.	
¿Cómo se toman?	 Tome tres píldoras por vía oral dos veces por día, a la mañana y a la noche (seis píldoras en total por día). Tómelas junto con la comida o solas. Debe tragarlas enteras.	 Tome cuatro píldoras por vía oral dos veces por día, a la mañana y a la noche (ocho píldoras en total por día). Tómelas junto con la comida o solas. Debe tragarlas enteras.
¿Quiénes pueden tomarlas?	 Personas a partir de los 12 años que pesen 88 libras o más y que tengan riesgo alto.	 Personas a partir de los 18 años con riesgo alto ¹ . No están aprobadas para el uso en pacientes menores de 18 años , ya que este medicamento puede afectar el crecimiento de los huesos y cartílagos.
¿Cómo funciona?	Bloquea una proteína que el virus usa para crecer.	Se inserta en la composición genética del virus.
¿Qué tan efectiva es?	Disminuye el riesgo casi un 90% .	Disminuye el riesgo alrededor de un 30% .
¿Cómo deben tomar estos medicamentos los pacientes?	 Solo con receta médica.	
¿Cuándo debe recetarse?	 Comenzar dentro de los cinco días posteriores a la primera aparición de los síntomas.	
¿Durante cuánto tiempo deben tomarse las píldoras?	 Cinco días.	

¹ Deben usarse únicamente cuando no hay otro tratamiento disponible para la COVID-19 de leve a moderada.



Si tiene preguntas, comuníquese con Health Net al número gratuito 800-675-6110 (TTY: 711) las 24 horas del día, los 7 días de la semana.